
【MRCP 検査を受けられる患者さんへ】



◎MRCP 検査について

主に胆嚢や胆管・膵臓を撮像する検査です。検査前にボースデルという液体（陰性造影剤）を服用して頂く場合がございます。

ボースデルはマンガンが含まれた液体です。服用することで胆管や膵管がはっきりと見えるようになり、正確に把握できるようになります。

◎造影剤の副作用について

使用する造影剤は安全な薬剤ですが、まれに副作用が現れることがあります。

○主な副作用： 軟便

このような副作用の起こる確率は、約 100 人につき 5 人、つまり 5%です。

○その他の副作用：下痢・腹痛・腹鳴・悪心・胸やけ・頭痛など

このような副作用の起こる確率は、約 1000 人につき 1 人、つまり 0.1%です。

服用時の注意

禁忌

- ・消化管穿孔又はその疑いがある患者
- ・本剤に対し過敏症の既往のある患者

その他

- ・テトラサイクリン系経口抗生剤、ニューキノロン系経口抗菌剤、セフジニルを服用されている場合は、薬剤作用が減弱する恐れがある為、造影検査終了後 3 時間程度は内服時間を空けて頂く必要がございます。
- ・妊娠中の投与に関する安全性は確立されておりません。主治医の判断となります。本剤内服後 48 時間は微量ですが母乳中に排出されますので、授乳は避けて下さい。

※検査担当医師の判断で造影剤を使用しない場合があります。ご了承下さい。

【MRCP 検査同意書】

上記内容を理解し、

- 検査を受けることに同意いたします。
- 検査を受けることに同意しません。

年 月 日

本人（署名）： _____

代諾者（署名）： _____（続柄 _____）

上記患者に対して、私が検査・処置に関する説明を行い、同意もしくは同意しないことを確認しました。

_____年 月 日

施設名 _____ 説明医師： _____（署名）