



薬剤部 DI ニュース

ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤に焦点を当て、視覚的にイメージしやすいように薬効発現時間、持続時間と薬効消失時間を図として表してみました。



➤ハルシオンの効果発現時間は10～15分と超即効性であるので、薬を飲んだらすぐに横になれる状態にするなど、服用時には注意が必要です。

➤マイスリーとドラールは効果発現時間のばらつきが大きいのが特徴です。さらに、ドラールは持続時間が長いうえに持続時間の個人差も大きいいため、コントロールしにくい薬です。

➤マイスリーは筋弛緩作用が弱い特徴を持ちますが、転倒事故などの事例報告がないわけではなく、他のベンゾジアゼピン系薬剤と同様に注意が必要です。

➤リスミーは効果発現時間が30～60分と比較的遅いため、入眠障害のある場合は他の効果発現時間の短いベンゾジアゼピン系の薬剤が適しています。

このように同じベンゾジアゼピン系の薬剤でも、効果発現時間や持続時間それに薬効消失時間が異なる上に、患者さん個々によっても効果時間は違ってくるため、薬剤それぞれの特徴を踏まえて慎重に選択する必要があります。

《薬剤部 初瀬(実習生)・長ヶ原》