

- 添付文書の使用上の注意の項に、尿および便の着色の記載のある院内採用医薬品についてまとめました

尿の着色を起こす薬剤

| 色調                     | 成分名             | 主な商品名         | 備考            |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 赤色                     | 塩酸エピルビシン        | ファルモルビシン注     |               |
|                        | 塩酸ダウノルビシン       | ダウノマイシン注      |               |
|                        | 塩酸ドキシソルビシン      | アドリアシン注       |               |
|                        | 塩酸ピラルビシン        | テラルビシン注       |               |
|                        | セフジニル           | セフゾン細粒・Cap    |               |
|                        | ヒベンズ酸チペピジン      | アスペリン散・Sy     |               |
| 赤褐色                    | イミペネム・シラスタチンNa  | チエナム注         |               |
| 橙赤色                    | リファンピシン         | リファジンCap      |               |
| 黄赤色                    | サラゾスルファピリジン     | サラゾピリン錠       | 尿がアルカリ性のとき着色  |
| 橙黄色                    | カルバゾクロムスルホン酸Na  | アドナ(AG-17)散・注 |               |
| 黄褐色又は赤色                | センナ・センナ実        | アローゼン顆粒       |               |
|                        | センノシド           | プルゼニド錠        |               |
|                        | エパルレスタット        | キネダック錠        |               |
| 茶色                     | パニペネム、ベタミプロン    | カルベニン注        | 採尿後時間の経過と共に着色 |
| 緑色                     | トラニラスト          | リザベンCap       |               |
| 黄褐色～茶褐色、緑色、青色          | 塩酸ミノサイクリン       | ミノマイシン錠・注     |               |
| 黒色                     | レボドパ、カルビドパ      | ネオドパストン錠      |               |
| 着色、変色                  | アトルバスタチンCa      | リピトール錠        |               |
|                        | プロポフォール         | ディプリバン注       | 変色尿(白濁、緑尿)    |
| 尿潜血反応検査で偽陰性を呈することがあるもの | アスコルビン酸         | ハイシー顆粒        |               |
|                        |                 | ビスコリン注        |               |
|                        | 高カロリー輸液(ビタミン配合) | フルカリック注       |               |

便の着色を起こす薬剤

| 色調                     | 成分名                  | 主な商品名      | 備考                         |
|------------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| 黒色                     | クエン酸第一鉄ナトリウム         | フェロミア顆粒・錠  |                            |
|                        | クエン酸鉄アンモニウム          | フェリセルツ散    |                            |
|                        | シタラビンオクホスファート        | スタラシドCap   |                            |
|                        | ピロリン酸第二鉄             | インクレミンSy   |                            |
|                        | メシル酸パズフロキサシン         | パシル点滴静注液   |                            |
| 赤色                     | セフジニル                | セフゾン細粒・Cap | 粉ミルク、経腸栄養剤など鉄添加製品との併用により着色 |
| 橙赤色                    | リファンピシン              | リファジンCap   |                            |
| 白色                     | テガフル、ギメラシル、オテラシルカリウム | ティーエスワンCap |                            |
| 糞便中に白色物                | メサラジン                | ペンタサ錠      | 本剤のコーティング剤は水に不溶のため糞便中に排泄   |
| 便潜血反応検査で偽陰性を呈することがあるもの | アスコルビン酸              | ハイシー顆粒     |                            |
|                        |                      | ビスコリン注射液   |                            |
|                        | 高カロリー輸液(ビタミン配合)      | フルカリック注射液  |                            |



た。