

## 先発品のみ特定の効能効果を有する医薬品リスト

下記の表は当院に採用のある医薬品(=赤字)に抜粋しております。

有効成分名	医薬品名	違いのある効能効果
アダリムマブ	◆ヒュミラ皮下注40mgペン0.4ml	・化膿性汗腺炎 ・壊疽性膿皮症
	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4ml	—
インフリキシマブ	レミケード点滴静注用100	既存治療で効果不十分な下記治療 ・腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ・川崎病の急性期
	インフリキシマブBS点滴静注用100mg	—
ウステキヌマブ	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	・中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ	—
エダラボン	◆ラジカット点滴静注バッグ30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
	エダラボン点滴静注液30mgバッグ	—
エリブリンメシル酸塩	◆ハラヴェン静注1mg	悪性軟部腫瘍
	エリブリンメシル酸塩静注液1mg	—
オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドンTR錠5mg、10mg、40mg	非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛
	オキシコドン徐放錠5mg、10mg、40mg	—
スニチニブリンゴ酸塩	スーテントカプセル12.5mg	膵神経内分泌腫瘍
	スニチニブ錠12.5mg	—
ダルベポエチンアルファ	ネスブ注射液◆30μgブラシリンジ60μg、120μg	骨髄異形成症候群に伴う貧血
	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ ◆60μg、120μg	—
トラスツズマブ	ハーセプチン注射用60、150	HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌
	トラスツズマブBS点滴静注用60mg、150mg	—
トルバプタン	サムスカOD錠7.5mg、15mg	・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ・腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
	トルバプタンOD錠7.5mg、15mg	—
フィルグラスチム	グランシリンジ75	神経芽腫に対するジヌツキシマブの抗腫瘍効果の増強
	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ	—

有効成分名	医薬品名	違いのある効能効果
フェンタニル クエン酸塩	フェントステープ1mg、4mg	[成人] 中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛 [小児] 小児における効能
	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg、4mg	—
ペグフィル グラスチム	ジーラスタ皮下注3.6mg	造血幹細胞の末梢血中への動員
	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg	—
ベバシズマ ブ	アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL	・進行又は再発の子宮頸癌 ・切除不能な肝細胞癌
	ベバシズマブBS点滴静注100mg、400mg	—
ベンダムスチン 塩酸塩水和物	トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL	慢性リンパ性白血病
	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL	—
ボルテゾミ ブ	ベルケイド注射用3mg	・マントル細胞リンパ ・全身性ALアミロイドーシス
	ボルテゾミブ注射用3mg	—
ランジオ ロール塩酸 塩	オノアクト点滴静注用50mg	・[成人] 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 ・[成人] 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈：心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ・[小児] 機能低下例における下記の頻脈性不整脈：上室頻拍、心房細動、心房粗動
	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg	—
リツキシマ ブ	リツキサン点滴静注100mg、500mg	・CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ・難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型、ステロイド依存性あるいはステロイド抵抗性を示す場合） ・全身性強皮症 ・難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ・視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防 ・下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制：腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植 ・下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療：腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植
	リツキシマブBS点滴静注100mg、500mg	—
リバーロキサ バン	イグザレルトOD錠10mg、15mg	・[小児] 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 ・Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制
	リバーロキサバンOD錠10mg、15mg	—
レナリドミ ド水和物	レブラミドカプセル5mg	・再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ・再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫
	レナリドミドカプセル5mg	—

後発品に切り替える際には効能効果の違いにご注意ください。  
ご不明な点がございましたら、薬剤部までご相談ください。



参考文献：日本ジェネリック製薬協会  
[250130\\_effectiveness.pdf](https://www.jgpa.or.jp/250130_effectiveness.pdf)